


くすりのしおり・注射版

2009年 6月作成

この薬の名前は	<ul style="list-style-type: none"> 商品名：レボホリナート点滴静注用25mg「BT」 	<ul style="list-style-type: none"> 商品名：Levofolinato 一般名：レボホリナートカルシウム 適用区分： 医薬品コード 620005724 	<ul style="list-style-type: none"> 剤形写真 
この薬の働きは	<ul style="list-style-type: none"> 抗腫瘍剤（フルオウラシル）と併用することで、がん細胞の増殖を抑える効果を増強させます。精脈内に点滴静注することで、胃がん（手術できないあるいは再発した）または結腸・直腸がんに対して効果の増強が期待できます。 		
注射のまえに確認すること	<ul style="list-style-type: none"> 次のような人は注射のまえに主治医に申し出てください： 以前に薬を飲んで、または注射を受けて、発しんやかゆみなどが出たことがある。 白血球など血液の検査値が低い。下痢がある。熱がある。水ぼうそうや他の感染症にかかっている。心臓に病気がある。体がだるいと感じている。 この注射を行う期間： 注射の間隔は、一緒に使用する他の薬や、患者さんの状態などによって異なりますので、具体的な投与期間については、主治医に確認してください。 注射の方法： 通常、ブドウ糖液、生理食塩液、または電解質維持液等の溶解液に混ぜ、点滴静注します。 その他： 授乳中、妊娠または妊娠している可能性がある。他の抗がん剤を使っている。放射線治療を受けている。 		
副作用について	<ul style="list-style-type: none"> 薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。 ◎次のような症状に気づいたら、すぐに主治医や薬剤師、看護師に申し出てください： <u><下痢・腸炎>泥状または水様の便が続く。おなかが痛くなる。便に粘液が混ざることがある。</u> <u><骨髄機能抑制>寒気がする。発熱。出血しやすい。</u> <u><過敏症>発しんやかゆみがある。息が苦しい。めまいがする。</u> <ショック・アナフィラキシー様症状>顔などがほてる。脈が速くなるあるいは遅くなる。胸が苦しくなる。 <白質脳症、精神・神経障害>歩行時にふらつく。舌のもつれがある。 <うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症>どうき。胸が痛い。足がむくむ。 <肝機能障害・黄疸>尿の色が濃くなる。白目や皮膚が黄色くなる。 <急性腎不全>血尿が出る。尿量が減る。 <間質性肺炎>から咳がでる。熱がでる。息が苦しい。 <消化管潰瘍、重篤な口内炎>腹痛がある。黒い便が出る。口の中が荒れる。 <手足症候群>手のひら、足の裏に赤い発しんなどがでる。 <播種性血管内凝固症候群（DIC）>皮下出血など、出血しやすくなる。 <嗅覚脱失>においが分かりにくくなる。 		

* ここには、知っておいていただきたい主な事柄だけが書いてあります。更にくわしく知りたい時は、主治医や薬剤師、看護師におたずねください。

くすりのしおり・注射版

2009年 6月作成

	<p> <高アンモニア血症>手指のふるえ。 <急性膀胱炎>上腹部が痛む。背中が痛い。 <劇症肝炎、肝硬変>食欲がない。黄疸が出る。 <寝室性頻脈>胸が痛い。 <ネフローゼ症候群>体がむくむ。 <皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症>手足に輪状の紅斑、やけどのような症状がでる。 <溶血性貧血>ふらつく。出血しやすい。 <消化器>食欲不振、悪心・嘔吐、味覚異常、腹痛、心窩部痛、口渇、便秘、下血、口角炎、舌炎、胸やけ、腹部膨満感。 </p> <p> ◆次のような症状に気づいたら、早めに主治医や薬剤師、看護師に相談してください： </p> <p> <色素沈着>、<脱毛>、<発熱>、<低蛋白血症>、<低アルブミン血症> </p> <p> ◇上記のほかに次のような副作用が出ることがあります： </p> <p> <蛋白尿>、<血尿>、<しびれ>、<めまい>、<末梢神経障害>、<色素沈着>、<脱毛>、<落屑>、<紅斑>、<表皮剥離>、<角化>、<糜爛>、<水疱>、<浮腫>、<紅潮>、<そう痒感>、<爪の異常>、<光線過敏症>、<発疹>、<心電図異常>、<不整脈>、<胸痛>、<胸内苦悶>、<流涙>、<眼充血>、<眼脂>、<結膜炎>、<倦怠感>、<糖尿>、<頭重感>、<呼吸困難>、<顔面浮腫>、<手指の腫脹>、<鼻出血>、<筋肉痛>、<電解質異常（低ナトリウム血症、低カリウム血症、高カリウム血症、低クロール血症、高クロール血症、カルシウム血症）>、<頭痛>、<耐糖能異常>、<白血球増多>、<好酸球増多> </p> <p> ・他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。 </p>		
注射のあとに 注意すること	・		
その他	・		
説明日	年 月 日	説明者	

* ここには、知っておいていただきたい主な事柄だけが書いてあります。更にくわしく知りたい時は、主治医や薬剤師、看護師におたずねください。